



โรคพิษสุนัขบ้า ...ยังมีอยู่!



เฝ้าระวังได้แล้ววันนี้
ทุกบ้าน ทุกชุมชน



สถานการณ์ โรคพิษสุนัขบ้า

จังหวัดนครราชสีมา ปี 2569

พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 ราย

เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 53 ปี
ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา

Time line

6 ร.ค. 68

ถูกสุนัขกัด มีแผลรอยสุนัขกัด
ที่ขา 2 ข้าง

11 ก.พ. 69

เริ่มป่วย มีไข้ ทานยาลดไข้ ไข้ไม่ลด

12 ก.พ. 69

มารักษาด้วยอาการ ไข้ เหนื่อย
ปัสสาวะไม่ออก

13 ก.พ. 69

มารักษาที่ห้องฉุกเฉิน ด้วยอาการ
ปวดท้อง กลืนน้ำไม่ได้ เจอลมพุดแรง
แล้วสะดุ้ง หนาวสั่น ให้ประวัติกับแพทย์
ว่า 2 เดือนที่แล้ว ถูกสุนัขกัด แต่ไม่ได้
รับวัคซีน

15 ก.พ. 69

เสียชีวิต (สว.มหาราชนครราชสีมา)

17 ก.พ. 69

ผลการตรวจพบเชื้อในเนื้อสมอง

พบสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า จำนวน 2 ตัว

ม้า จำนวน 1 ตัว

📍 อ.เมืองนครราชสีมา

สุนัข จำนวน 1 ตัว

📍 อ.ประทาย



#ถูกสัตว์กัด ข่วน เลียแผล ให้ไปฉีดวัคซีนทันที



**ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายได้
และเป็นอันตรายถึงชีวิต 100%**

**เพราะฉะนั้น...การล้างแผล และฉีดวัคซีนทันที
หลังถูกกัด ข่วน เลียแผล สำคัญที่สุด**



อาการคนที่ป่วย โรคพิษสุณัขบ้า



1 ระยะเวลาเริ่มต้น 2-10 วันแรก

- ✓ มีไข้ต่ำๆ หนาวสั่น และอ่อนเพลีย
- ✓ คับ ยิบๆ หรือปวดเสียว แผลเดิมที่ถูกกัด (แม้หายสนิทแล้ว)

2 ระยะเวลาอาการทางระบบประสาท

80%
จะมีอาการ

กลืนน้ำ = เกร็งของกล้ามเนื้อคอหอยอย่างรุนแรง....
เมื่อพยายามดื่มน้ำ หรือเพียงแค่เห็น หรือได้ยินเสียงน้ำ

กลืนลม = สะดุ้งตกใจหอบเหนื่อย เมื่อถูกลมพัดผ่าน

กระสับกระส่าย = คุ่มคลั่ง เอะอะโวยวาย มีน้ำลายไหลมาก
และอาจพยายามกัดคนที่อยู่ใกล้เคียง

20%
จะมีอาการ

- ✓ กล้ามเนื้ออ่อนแรง เริ่มจากแผล และลามไปทั่วร่างกาย
จนกระทั่งเสียชีวิต

3 ระยะสุดท้าย

- ✓ ระบบหายใจล้มเหลว หัวใจหยุดเต้น และเสียชีวิตในเวลาไม่กี่วัน

ผู้เลี้ยงสัตว์ ต้องปฏิบัติดังนี้

1

ตรวจสอบ

ว่าได้รับวัคซีนป้องกัน
พิษสุนัขบ้า ครบหรือไม่

- ✓ ปีแรก ฉีด 2 เข็ม
- ✓ ปีต่อมา ฉีด 1 เข็ม ทุกปี
- ✓ ถ้าไม่ได้ฉีด **“ให้พาไปฉีดโดยเร็ว”**

2

สังเกต

อาการสัตว์ที่เปลี่ยนไป

ระยะแรก 2-3 วัน

- ✓ หงุดหงิด/ดุร้าย
- ✓ ซึมผิดปกติ/หลบซ่อนตัวในที่มืด
- ✓ เสียงเห่า/ร้องเปลี่ยนไป

ระยะรุนแรง

- ✓ ดุร้ายผิดปกติ/กัดไม่เลือก
- ✓ ซึม/เบื่ออาหาร
- ✓ กลืนน้ำหรืออาหารลำบาก
- ✓ กรามค้าง/ลิ้นห้อย น้ำลายฟูมปาก
- ✓ เดินโซเซ / ขาหลังอ่อนแรง / ขาแข็ง
- ✓ เป็นอัมพาต
- ✓ เสียชีวิต ใน 7-10 วัน

3

หากมีอาการดังกล่าว...

ให้แยกสัตว์เลี้ยงออกจากคนทันที
ห้ามสัมผัสน้ำลาย และรีบแจ้ง
สัตวแพทย์หรือปศุสัตว์

4

เมื่อถูกสัตว์ กัด ข่วน เสียแผล
ให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่
และรีบไปพบแพทย์ทันที



ความน่ากลัวของ... โรคพิษสุนัขบ้า



มีผู้เสียชีวิต
3 ราย
ใน 2 ปี

สุนัข
จรจัด
มีจำนวนมาก
:



พบสุนัข
มีเชื้อโรค
พิษสุนัขบ้า
อย่างต่อเนื่อง

ยังมี สุนัข/แมว ที่มีเจ้าของ
หรือจรจัด...
ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
ป้องกันพิษสุนัขบ้า

คนที่ถูกสุนัข
กัด ข่วน เลียแผล
ไม่เข้ารับ
ฉีดวัคซีนป้องกัน



เมื่อเชื้อ...
แสดงอาการแล้ว
ไม่สามารถรักษาได้
**เสียชีวิต
ทุกราย**

